

Inhoudsopgave

- **Inleiding**
- **Waarom een bovenooglidcorrectie**
- **Vorbereiding**
- **Consult**
- **De ingreep**
- **Voordelen van een bovenooglidcorrectie**
- **Na de ingreep**
- **Complicaties**
- **Kosten**
- **Tot slot**
- **Resultaten foto's**

Inleiding

U overweegt een bovenooglidcorrectie. In deze brochure leest u alles over de indicatie voor een dergelijke ingreep, de voorbereiding, de ingreep zelf en de periode na de ingreep.

Heeft u nog vragen na het bezoek aan de kliniek en het lezen van deze informatie, neem dan gerust contact met ons op. Zo nodig plannen we een extra afspraak in bij de arts.

Waarom een bovenooglidcorrectie?

Naarmate we ouder worden verslapt de huid en kunnen er hangende oogleden ontstaan. Daarnaast kan het erfelijk bepaald zijn waardoor je al op relatief jonge leeftijd klachten van hangende oogleden kunt ervaren.

De klachten die men ervaart van hangende bovenoogleden zijn erg verschillend. Hangende oogleden kunnen u een vermoeide uitstraling geven. Daarnaast kunnen er klachten ontstaan zoals hoofdpijn, vermoeidheid of een verminderd gezichtsvermogen. Na een bovenooglidcorrectie krijgt u weer een frisse blik en zijn vaak klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid of een verminderd gezichtsvermogen verdwenen. Een bovenooglidcorrectie is een relatief kleine ingreep maar kan een wereld van verschil maken. In deze brochure leest u stap voor stap alle informatie met betrekking tot een bovenooglidcorrectie.

Vorbereiding

Zelf kunt u niet veel voorbereiden aan de bovenooglidcorrectie. Wel kunt u zorgen dat u alles in huis heeft voor een goed herstel. U mag na de ingreep niet veel doen en dient uw rust te nemen. Zorg ervoor dat u voldoende paracetamol in huis hebt. Als u rookt is het bij een bovenooglidcorrectie noodzakelijk om te stoppen. Roken verhoogt namelijk de kans op wondgenezingsproblemen. Het kan zijn dat u met bepaalde medicatie zoals bloedverdunners tijdelijk moet stoppen. Dit is afhankelijk van de medicatie en kunt u bespreken tijdens een consult met de arts.

Consult

Voorafgaand aan de ingreep wordt er altijd een consult ingepland met de arts. De arts luistert naar uw wensen en bekijkt of de ingreep geschikt voor u is. Tijdens dit consult kunt u al uw vragen aan de arts stellen. De arts zal u informeren over het te verwachten resultaat en er kunnen foto's worden gemaakt die in uw medisch dossier worden gezet.

De ingreep

Een bovenooglidcorrectie gebeurt onder lokale verdoving. Dat wil zeggen dat alleen het gebied van de bovenoogleden wordt verdoofd. Er wordt niet behandeld onder een algehele narcose omdat dit een veel grotere impact op het lichaam heeft wat onnodig is. Wij zorgen ervoor dat u niks van de ingreep voelt na de verdoving. Doordat de ingreep onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd mag u gewoon eten en drinken van tevoren.

Het gebied wordt gedesinfecteerd en het probleemgebied wordt afgetekend. De rest van het lichaam wordt afgedekt en de oogleden worden verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt wordt de overtollige huid verwijderd en wordt het overtollige vet in de bovenoogleden verwijderd. Het weghalen van overtollig vet zorgt voor het mooiste resultaat en is in de behandelprijs inbegrepen.

Na het verwijderen van de overtollige huid en het plaatselijke vet worden de bloedvaatjes dichtgeschroeid en de wond gehecht. De hechtingen vallen zo veel mogelijk in de oogplooi waardoor een litteken niet tot amper op zal vallen.

De ingreep neemt totaal ongeveer 45 minuten in beslag. U mag kort na de ingreep dezelfde dag weer naar huis. Zorg er altijd voor dat u iemand mee neemt die u na de ingreep thuis brengt, u mag zelf absoluut geen auto rijden.

Voordelen

Naast een bovenooglidcorrectie is er ook een onderooglidcorrectie mogelijk. De arts kan tijdens een consult beoordelen of dit een geschikte behandeling voor u is. Wij zetten de voordelen van een bovenooglidcorrectie graag voor u op een rijtje:

- Minder vermoeide ogen
- Hoofdpijn verdwijnt
- Geen drukkend gevoel meer op de ogen
- Beter zicht
- Onzichtbare littekens
- Pijnloze ingreep
- Korte en kleine ingreep

Na de ingreep

De duur van het herstel na een bovenooglidcorrectie verschilt per persoon. Het behandelde gebied zal na de behandeling eerst op gaan zwellen en kan blauwe plekken en bloeditstoringen vertonen. Na enkele dagen is er al een mooie verbetering te zien van het lichaam. De meeste zwelling is na een week weggetrokken. Het definitieve resultaat is na drie tot zes maanden te beoordelen.

Na een week worden de hechtingen verwijderd en heeft u direct een controle afspraak. Er wordt eventueel nog een controle afspraak na 6 maanden ingepland. Totdat de hechtingen verwijderd zijn mag u niet tillen, persen of bukken. U mag na 3 weken weer fysieke inspanning leveren en al uw sportactiviteiten oppakken.

Na de behandeling is het belangrijk het gebied te koelen. Het gebied moet droog blijven tot de hechtingen zijn verwijderd. U mag wel douchen maar probeer het behandelde gebied droog te houden. U mag geen bezoek brengen aan de sauna of het zwembad tot de wond dicht is en de hechtingen eruit zijn gehaald!

Littekens kunnen de eerste drie maanden rood zijn. Daarna nemen ze geleidelijk de kleur van uw huid aan. Bescherm de littekens 3 tot 6 maanden tegen Uv-straling. Het kan zijn dat het gebied van uw oogleden wat doof aanvoelt. Dit gevoel kan ook 3 tot 6 maanden aanhouden.

Wanneer kunt u weer aan het werk?

De meeste mensen beginnen na het verwijderen van de hechtingen weer met administratief werk. Wij raden het aan om na de behandeling direct een week verlof op te nemen. Verricht u fysiek zwaar werk? Bespreek dit dan met de arts.

Complicaties

Elke operaties brengt risico's en een mogelijke complicatie met zich mee. Alle risico's worden uitgebreid met u besproken. Een bovenooglidcorrectie is een relatief kleine ingreep. Er kan na de operatie een klein verschil zijn tussen het linker en rechter oog. Vaak is dit voor de operatie al zo. Het resultaat van een bovenooglidcorrectie is meestal voor lange tijd. Als de huid en de spier rondom het oog verder verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn. U dient contact op te nemen met de kliniek indien de wond warm en erg pijnlijk wordt.

Kosten

Bovenooglidcorrectie door premium arts: Drs. Babak Mahdavian Delvary: €850,-

Resultaten





Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op een gesprek met de arts. Ieder persoon is verschillend en daarom ieders individuele situatie met betrekking tot de behandeling verschillend. Graag staat een van onze artsen u te woord tijdens een consult.

Plan een gratis consult: 0492-313044

Of boek in de online agenda: www.beautenature.nl